



TABA[®]

- Mükemmel çiçeklenme
- Homojen meyve tutumu
- Sıcak, soğuk ve ilaç stresine dayanım



bioglobal
kalıntısız bio çözümler

Neden TABA uygulamalıyız?

- TABA, yapraktan uygulanan bir üründür.
- TABA, bitki hücresindeki tuz ve şeker oranını, soğuk ve sıcak stresine karşı düzenleyerek, bitkinin hormonal dengesini sağlar.
- TABA, hormonal ve enzimatik hareketleri teşvik ederek bitkinin fizyolojik etkinliğini artırır.
- TABA, düşük sıcaklıklarda ve yoğun yağışlarda büyümede meydana gelen yavaşlamayı önler.
- TABA, bitki bünyesinde, böcek ilaçları ve ot ilaçlarından kaynaklanan kimyasal madde stresinin neden olduğu büyüme yavaşlamasını önler.
- TABA, bitki besleme ve bitki koruma uygulama hatalarından kaynaklı stres koşullarında çok etkilidir.
- TABA bitki bünyesi ile sinerjik bir ilişki içine girer ve büyüme fonksiyonlarını hızlandırır.
- TABA bitkide verimi ve ürün kalitesini arttıran bir etki yaratır.

ZEYTİN

- Mükemmel çiçek ve meyve tutumu.
- Homojen yüksek kaliteli meyve tutumu.

MEYVE (Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı, Armut, Elma, Nar)

- Çatlamayı önler, meyve sapını güçlendirir.
- Stres koşullarında bile homojen ve yüksek kaliteli çiçek oluşumu ve meyve tutumu sağlar.

SEBZE (Biber, Patlıcan, Hıyar, Domates, Fasulye)

- Mükemmel meyve ve çiçek tutumu.
- Güçlü büyüme.
- Verim artışı.
- Yeterince vejetatif büyüme.

PAMUKTA

- Mükemmel koza büyümesi.

BUĞDAYDA

- Herbisit stresinde azalma.
- Çok iyi filizlenme ve koyu yeşil renk.



BİTKİ ADI	KULLANIM DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soya Fasulyesi, Bostan, Tüm Baklagiller	50-75 ml/da (tarla) 150-300 ml/100 lt. su (sera)	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama mevve oluşmaya başlarken yapılır.
Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Erik, Narenciye, Badem, Fındık, Antep Fıstığı, Zeytin vs.	100 ml/100 lt. su	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama ilk uygulamadan 25-30 gün sonra taç yapraklar düştükten sonra yapılır.
Çilek	50 ml/da	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama bundan 25-30 gün sonra yapılır.
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır vs.	50-75 ml/da	İlk uygulama kardeşlenme sonrasında, ikinci uygulama ise ikinci boğum oluştuğunda yapılır.
Pamuk	50 ml/da	İlk uygulama taraklar görülmeye başladığında, ikinci uygulama ilk uygulamadan 3-4 hafta sonra yapılır.
Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul, Karnabahar, Lahana	50 ml/da	İlk uygulama bitkiler 4-6 yapraklı iken yapılır.
Süs Bitkileri	75-100 ml/100 lt. su	İlk uygulama süs bitkileri 10-20 cm yükseklikte iken yapılır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Yonca, Yem Bitkileri	50 ml/da	İlk tatbikat bitkiler 10-15 cm yüksekte iken yapılır. Her kesimden sonra bitkiler yine 10-15 cm boya erişince uygulama tekrarlanmalıdır.
Şeker Pancarı, Patates vs.	50 ml/da	İlk uygulama yumrular oluşmaya başladığında yapılır ve 20-30 gün sonra tekrarlanır.