



VITORMONE PLUS

Kirazınıza artı renk ve irilik katar...

İkizlenmeye Son!

- ✚ Meyve tutumunu arttırır.
- ✚ Meyve sapını uzatır ve kalınlaştırır.
- ✚ Meyvede daha hızlı ve yoğun renklenme meydana gelir.
- ✚ İri ve homojen meyve oluşumu sağlar.

CEVRE DOSTU %100 DOĞAL BIOGLOBAL


global

bioglobal
ile Tarımda Özgürlük...

VITORMONE PLUS

Azotunuz Havadan...

Yaprakta çalışan Azot Bakterisi




VITORMONE PLUS uygulanmamış

VITORMONE PLUS uygulanmış

Vitormone Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulamadan önce ambalaj açılmadan iyice çalkalanmalıdır.
- Uygulama sıcak ULV (termal-fogy) aletleriyle yapılmamalıdır.
- Uygulamalar güneş battıktan sonra veya akşam üzeri yapılmalıdır.
- Uygulamaların ardından yapraktan kimyasal fungusit (özellikle bakır) uygulaması 7-10 gün sonra yapılmalıdır.
- Noniyonik olan iyi bir yayıcı-yapıştırıcı ile kullanılması etkinliğini arttırır.
- Aminoasit, bitki gelişim düzenleyicileri veya organik madde içeriği yüksek yaprak gübreleri ile kombine edilirse etkinlik daha da artar.

KIRAZ GELİŞİM DÖNEMLERİ:



bioglobal
ile Görkemli Yollar...

Bahçelievler Mah.Konyaaltı Cad.No:54/13 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242.243 47 40 (pbx) Fax: 0242.243 37 40
info@bioglobal.com.tr • www.bioglobal.com.tr



0533 550 17 31



bioglobal_a.s

Bioglobal Türkiye



VITORMONE PLUS

Üzüme Standart Getirdik...

Analı Kızlıya son!

- + Bitkiye enerji harcatmadan havadan azot gübrelemesi yapar.
- + Azotlu gübrelemede %25-30 tasarruf edilir.
- + İri ve homojen meyve oluşumunu sağlar, uç kurumasını ortadan kaldırır.
- + İçerdiği *Azotobacter spp.* sayesinde 21 gün boyunca yaprakta çalışır.


CEVRE DOSTU
%100 DOĞAL

bioglobal
kalıntısız bio çözümler

VITORMONE PLUS

Azotunuz Havadan...

Yaprakta çalışan Azot Bakterisi



Vitormone Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulamadan önce ambalaj açılmadan iyice çalkalanmalıdır.
- Uygulama sıcak ULV (termal-fogy) aletleriyle yapılmamalıdır.
- Uygulamalar güneş battıktan sonra veya akşam üzeri yapılmalıdır.
- Uygulamaların ardından yapraktan kimyasal fungusit (özellikle bakır) uygulaması 7-10 gün sonra yapılmalıdır.
- Noniyonik olan iyi bir yayıcı-yapıştırıcı ile kullanılması etkinliğini artırır.
- Aminoasit, bitki gelişim düzenleyicileri veya organik madde içeriği yüksek yaprak gübreleri ile kombine edilirse etkinlik daha da artar.

BAĞ GELİŞİM DÖNEMLERİ:



Bağda uygulama zamanı salkım
uzatma ve büyütme döneminde
100 ml/100 lt su



bioglobal
kalıntısız bio çözümler

Bahçelievler Mah.Konyaaltı Cad.No:54/13 Muratpaşa/Antalya
Tel: 0242.243 47 40 (pbx) Fax: 0242.243 37 40
info@bioglobal.com.tr • www.bioglobal.com.tr



0533 550 17 31



bioglobal_a.s

Bioglobal A.Ş.

Bioglobal Türkiye